

Leishmaniasis

La leishmaniasis es una [enfermedad parasitaria](#) diseminada por la picadura de un mosquito infectado.

Existen varias formas distintas de leishmaniasis. Las más comunes son la cutánea y la visceral.

El tipo cutáneo causa llagas en la piel. El tipo visceral afecta los órganos internos, tales como el bazo, el hígado y la médula ósea. Las personas con esta enfermedad suelen tener fiebre, pérdida de peso y aumento de tamaño del bazo y el hígado



- **Leishmaniasis**, sólo se **transmite** por mosquito. Una persona o un animal sólo pueden llegar a contagiarse de **leishmaniasis** con la picadura de un mosquito.
- Ni persona a persona, ni por un animal contagiado, contacto con saliva o con la úlcera que deja la **leishmaniasis**.

Principales factores de riesgo

- **Condiciones socioeconómicas**
- **Malnutrición**
- **Movilidad de la población**
- **Cambios ambientales**
- **Cambio climático**

Prevención de leishmaniasis

- **Desafortunadamente, no existen vacunas contra la leishmaniasis.** No obstante, contamos con algunas formas eficaces de prevenir la enfermedad. Estas son:

- **Educar a la población en riesgo.**

Proporcionar conocimientos básicos acerca de las manifestaciones clínicas y cómo se transmite la enfermedad.

- Evitar la picadura del flebótomo. Evitar penetrar en zonas boscosas infestadas de flebótomos, mantener la vivienda limpia, y colocar en las ventanas mallas metálicas o plásticas finas que eviten la entrada del flebótomo, usar ropa que cubra las zonas expuestas de la piel, especialmente en las horas de mayor actividad del flebótomo, utilizar mosquiteros de malla fina por las noches o aplicarse repelentes.
- Controlar los reservorios. Eliminar a las ratas y destruir sus madrigueras, así como vigilar el estado de salud de los perros domésticos a través de un control veterinario, o acudiendo a los servicios de atención a zoonosis en la unidad de salud más cercana.